



kupromeb

Bakıroksiklorür süspansiyonu olup, %22 metalik bakıra eş değerdir. Bitkinin bakır ihtiyacını karşılayan bir gübredir. Bakır noksanlığından ileri gelen sorunlara çözüm sağlar. Stres koşullarına yüksek direnç sağlar. Bitkilerin direncini artırır.

Garanti Edilen İçerik
Toplam Bakır (Cu)

: %w/w
: 22



BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZ (YAPRAKTAN)
Zeytin	1. uygulama : Hasat sonrası veya budama sonrası 2. uygulama : Çiçeklenmeden önce	500 gr. / 100 lt.su
Fındık, Ceviz, Badem	1. uygulama : Kış periyodu boyunca / budamadan sonra 2. uygulama : İlkbaharda tomurcukların yeni kabardığı dönemde	500 gr. / 100 lt.su
Elma, Armut	1. uygulama : Kış periyodu boyunca / budamadan sonra 2. uygulama : İlkbaharda çiçek tomurcukların yeni kabardığı dönemde	500 gr. / 100 lt.su
Kiraz, Vişne, Erik, Şeftali, Kayısı	1. uygulama : Yaprak dökümünden sonra / budamadan sonra 2. uygulama : Çiçekler açılmadan, tomurcukların yeni kabardığı dönemde	500 gr. / 100 lt.su
Bağ	1. uygulama : Kış periyodu boyunca / budamadan sonra 2. uygulama : Çiçekten önce sürgünler 20-30 cm'ye ulaştığında	500 gr. / 100 lt.su
Narenciye	Hasat sonrası maksimum 0.2 lt/da uygulama Ağaçta çiçek veya meyve varken uygulama yapmayınız.	200 gr. / 100 lt.su
Domates, Patlıcan , Biber	Dikimden 35 gün sonra (4 - 6 yaprak dönemi)	150 gr. / 100 lt.su
Antep Fıstığı	1. uygulama : Meyvelerin buğday danesi kadar olduğu dönem 2. uygulama : İlk uygulamadan 15-20 gün sonra	500 gr. / 100 lt.su
Patates	Tam yeşermeden 7-14 gün sonra ve yaprak analizini takiben yumru gelişimi sırasında uygulayınız.	500 gr. / 100 lt.su
Çiçek	Çiçeklenme öncesi erken sezonda uygulanır.	500 gr. / 100 lt.su
Tahıl	İki yaprak döneminde, ikinci boğum görüldüğünde ileri noksanlıklarda 15 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır. Sonbahar ekimlerinde kış soğuklarına girilmeden uygulama yapılması tavsiye edilir.	500 gr. / 100 lt.su
Toprak Uygulaması	Dikim öncesi uygulanır. Çok yıllık bitkilerde gelişme öncesi uygulanır.	1000 gr. / 100 lt.su